

Kofoeds enge



Engelskræs

Tør strandeng

Fugtig strandeng

Lagunesø og strandvold

AKVAREL: Carl Christian Tofte



Strandskade

Velkommen til Kofoeds Enge

Kofoeds Enge er en af Københavns-områdets sjældne landskabstyper – strandengen.

Landskabet

Hegnet, som man må gå langs med, danner grænsen mellem strandengen og istidens gamle morænelandskab med marker. Længst ude mod havet afløses strandengen af strandvolde, øer og lagunesøer.

Kørne hjælper fuglene

Strandengen er et vigtigt levested for planter og dyr. Det skyldes bl.a., at den aldrig har været dyrket eller sprøjtet og kun er tilført kvægets gødning. Kreaturerne græsning sikrer, at engen ikke gror til med høje tagrør, der vil ødelægge livsbetingelserne for mange planter og kystfugle.

Planterne tåler saltvand

En strandeng er speciel ved at den jævnligt bliver oversvømmet. Derfor gror her kun planter, der kan tåle havets saltpåvirkning. Særligt karakteristisk er de store spredte bestande af den grågrønne strandmalurt. Herudover kan man finde rød svingel, harril, strandkogleaks, strandtrehage, strandasters og engelskræs.

Vandet er spisekammer

I vandet ud for kysten findes bevoks-

ning af ålegræs, som fiskene udnytter som gyde- og opvækstområder. Ålegræs og fisk er sammen med muslinger, snegle og andre bunddyr føde for mange fugle. Også sæler nyder godt af de gode spisemuligheder.

Her yngler mange forskellige fugle

Forår og sommer er området domineret af fuglenes stemmer. Strandengens græs er redeplads for strand skade, klyde, vibe, alm. ryle, dobbeltbækkasin, rødben og gul vipstjert. Længere ude på strandvoldens sand og sten har stor præstekrave, havterne og dværgterne deres reder.

En vigtig mellemstation

En lang række fuglearter besøger eng og fladvand, når de forår og efterår er på vej til eller fra Nordskandinavien, hvor de yngler. Det er bl.a. islandsk ryle, lille kobbersneppe, strandhøjle, brushane og sort- og hvidklire. Flere af dem rejser mere end 10.000 km hver vej, så de har god brug for fred og ro til at hvile og spise i området.

Rovfugle svæver henover

På grund af Sydamaagers beliggenhed i forhold til fuglenes trækruter, kan man forår og efterår se træk af rovfugle hen over Sydvestpynten. Det er heller ikke ualmindeligt at se rørhøg og blå kærhøg i lav flugt søge føde over strandsumpen.



Dværgterne

Gul Vipstjert

Strandmalurt



Stor Præstekrave

Strandasters




Rødben



Lille Kobbersneppe

Strandkogleaks

Strandtrehage



Brushhøne

Harril

Brushhøne









Adgang til Kofoeds Enge


I perioden 1. april – 15. juli er det kun tilladt at færdes på den tørre eng længst væk fra vandet.


I den periode har vadefugle, tern og ænder deres reder på stranden og engen. Forstyrres de og jages fra rederne, dør ungerne af sult og kulde. Lave pæle afgrænser den tørre eng fra fuglebeskyttelsesområdet.

Badning kan foregå uden for området på stranden ved parkeringspladsen.

Kreaturerne er fredelige, men de må ikke generes. Færdsel blandt dem sker på eget ansvar.

-  Beskyttelsesområde adgangsforsbud 1.april – 15.juli
-  Tør strandeng
-  Fugtig strandeng
-  Strandvold og lagunesø
-  Morænelandskab
-  Hegn om Kofoeds enge
-  Afmærkning af beskyttelsesområde
-  Informationstavle

 Adgang forbudt i beskyttelsesområdet i fuglenes yngletid

 Hunde – altid i snor

 Ridning forbudt

